



تعیین حساسیت سویه‌های پنی باسیلوس لاروه نسبت به اکسیتراسیکلین. با استفاده از روش انتشار دیسک

محتبی محرومی*. حسین مدیر روستا. مریم ترکمن

بخش بیماریهای زنبور عسل، موسسه تحقیقات واکسن سرم سازی رازی، کرج، ایران

دریافت: دی ۱۳۹۴؛ پذیرش: فروردین ۱۳۹۵

پست الکترونیک نویسنده پاسخگو: Mojmoharami@yahoo.com

چکیده

پنی باسیلوس لاروه عامل بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) در زنبور عسل، یک باکتری گرم مثبت اسپور دار می‌باشد. این بیماری، مشکلات اقتصادی قابل توجهی را برای زنبورداران ایجاد می‌کند. استفاده گسترده از اکسیتراسیکلین علیه بیماری سبب تجمع باقی مانده دارویی در عسل و سایر محصولات کندو و کاهش کیفیت آنها شده و بازاریابی این محصولات را مشکل می‌کند. علاوه بر این، مقاومت به اکسیتراسیکلین در پنی باسیلوس لاروه های جدا شده در بسیاری از کشورها نیز گزارش شده است. در این مطالعه ۲۲ سویه از پنی باسیلوس لاروه های جدا شده از مناطق مختلف، برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش انتشار دیسک مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که ۷ سویه در برابر آنتی بیوتیک مورد مطالعه حساس و ۱۴ سویه دارای مقاومت متوسط و یک سویه مقاوم بود.

واژه‌های کلیدی: پنی باسیلوس لاروه، لوک آمریکایی، روش انتشار دیسک، اکسیتراسیکلین

مقدمه

نگرانی‌ها در مورد مشکلات ناشی از ایجاد مقاومت میکروبی در حال گسترش است و چشم انداز آینده استفاده از داروهای ضد میکروبی هنوز نامشخص است بنابراین، باید اقداماتی مثل بهینه سازی مصرف آنتی بیوتیک‌ها در حد مجاز و تولید داروهای جدید شیمیایی یا طبیعی^[۶]، می‌تواند در کنترل بیماری‌ها موثر باشد. در این مطالعه با هدف تعیین باکتری‌های مقاوم در برابر اکسیتراسیکلین، سویه‌های پنی باسیلوس لاروه‌های جدا شده از عسل‌های مناطق مختلف جهت تعیین حساسیت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مواد و روش‌ها

این مطالعه بر روی ۲۲ سویه پنی باسیلوس لاروه انجام گرفت (این سویه‌ها در طی سالیان گذشته از نمونه‌های عسل ارسالی

پنی باسیلوس لاروه عامل بیماری‌ای لوک آمریکایی، یک بیماری بسیار مسری در نوزادان زنبور عسل، می‌باشد^[۱]. به منظور کاهش خسارت زنبورداران، روش‌های دارویی به منظور درمان، پیشگیری و کنترل این بیماری ارائه شده است^[۲].

استفاده گسترده از آنتی بیوتیک‌ها از قبیل اکسیتراسیکلین سبب تجمع باقی مانده دارویی در عسل^[۳] و سایر محصولات کندو شده که این امر سبب کاهش کیفیت و بروز مشکلاتی در بازاریابی آنها می‌شود. علاوه بر تجمع باقی مانده دارویی، مقاومت به آنتی بیوتیک در پنی باسیلوس لاروه‌های استخراج شده در بسیاری از کشورها ایجاد شده است^[۴، ۵].





سویه مقاوم بود.

بحث

بیماری لوک آمریکایی یکی از مشکلات اصلی زنبورداران در سراسر جهان است. اسپورهای پنی باسیلوس لاروه بسیار مقاوم بوده و در اجزای داخلی کندو و همچنین تجهیزات به خوبی زنده باقی می‌مانند.

سویه باکتری	حساسیت به اکسی تراسیکلین
K _۱	متوسط
K _۲	متوسط
K _۳	متوسط
K _۴	متوسط
D _۵	متوسط
T _۶	متوسط
T _۷	متوسط
T _۸	متوسط
T _۹	متوسط
Sh _{۱۰}	متوسط
Sh _{۱۱}	حساس
Sh _{۱۲}	حساس
Sh _{۱۳}	حساس
Sh _{۱۴}	حساس
Sh _{۱۵}	حساس
Sh _{۱۶}	حساس
F _{۱۷}	متوسط
F _{۱۸}	حساس
V _{۱۹}	متوسط
L _{۲۰}	مقاوم
M _{۲۱}	متوسط
Ko _{۲۲}	متوسط

K: کرج / K.C: کرج-جاده چالوس / D: دیزین / T: طالقان / Sh: شمیرانات /

F: فیروزکوه / V: ورامین / L: لرستان / M: مهاباد / Ko: کردستان

سوزاندن کلنی‌های آلوده یک راه موثر برای کشتن اسپور و قطع سیکل بیماری است، که این مسئله به درستی از طرف غالب زنبورداران، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. روش‌های

به بخش زنبور عسل موسسه رازی جدا سازی و با روش‌های بیوشیمیایی و مولکولی تایید و در فریزر ذخیره شده‌اند). دیسک اکسی تراسیکلین (30mcg per disc) از شرکت پادتن طب تهیه شد.

تعیین تست حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک: روش انتشار دیسک برای سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی، عملی ترین روش برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی/ مقاومت میکروبی به عوامل ضد میکروبی مختلف است. دقت و تکرارپذیری این آزمون بستگی به حفظ

روش‌های استاندارد دارد. در این روش برای تعیین حساسیت/ مقاومت، پنی باسیلوس لاروه‌های جدا شده نسبت به اکسی تراسیکلین از محیط کشت MYPGP آگار استفاده شد[۷].

تعیین مقاومت / حساسیت: از سویه‌های پنی باسیلوس لاروه در محیط MYPGP آگار کشت به عمل آمد و به مدت ۴۸ ساعت در دمای $36^{\circ}C \pm 1$ قرار داده شدند. از باکتری‌های رشد یافته، سوسپانسیون با غلظت ۰/۵٪ مک فارلنده تهیه شد (درون لوله‌های درپوش‌دار استریل، توسط آب مقطار یا سرم فیزیولوژی استریل). از هر سوسپانسیون MYPGP باکتریایی، توسط یک سواب پنبه‌ای، روی محیط آگار کشت به عمل آمد. در هر پلیت یک دیسک اکسی تراسیکلین (۳۰ میکرو گرم) قرار داده شد. پلیت‌ها در دمای $36^{\circ}C \pm 1$ به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند. حساسیت به آنتی بیوتیک در هر نمونه با اندازه گیری قطر هاله فاقد رشد در پلیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت[۷].

نتایج

در این مطالعه، ۲۲ سویه پنی باسیلوس لاروه جدا شده از مناطق مختلف برای تست حساسیت آنتی بیوتیک با استفاده از روش انتشار دیسک مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که ۷ سویه در برابر آنتی بیوتیک مورد مطالعه حساس و ۱۴ سویه دارای مقاومت متوسط و یک





بیوتیکی به روش انتشار دیسک، آنتی بیوتیک اکسی تتراسیکلین در برابر ۲۲ سویه پنی باسیلوس لاروهای جدا شده از مناطق مختلف (برای تست حساسیت) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۱۴ سویه از ۲۲ سویه دارای مقاومت نسبی و یک سویه در برابر اکسی تتراسیکلین در غلظت (۳۰ میلی گرم/ دیسک) مقاوم بود. در واقع اکسی تترا سیکلین بر روی بیش از ۶۰٪ سویه‌های مورد مطالعه تاثیر کمی داشته و بر علیه یک سویه کاملاً غیرفعال بوده است و این بدان معنی است که درمان کلنی‌های مبتلا به لوک آمریکایی با آنتی بیوتیک اکسی تترا سیکلین، حتی فرم رویشی باکتری رانیز به طور کامل از بین نمی‌برد. بنابر این ادامه مصرف این آنتی بیوتیک در کلنی‌های زنبور عسل به افزایش روز افزون مقاومت باکتری پنی باسیلوس لاروا منجر خواهد شد. بنابر این لازم است که مطالعات بیشتری در آینده به منظور ارزیابی این آنتی بیوتیک‌ها در شرایط مزرعه صورت گیرد. باقیمانده‌ها و آلودگی‌های ناشی از آنتی بیوتیک‌ها، آلانددهای صنعتی، سموم، آفت‌کش‌ها، کودهای شیمیایی، گازها و آبهای آلوده سلامتی زنبور عسل را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد. مطالعات میدانی و آزمایشگاهی حاکی از آن است که باکتری‌های مفید دستگاه گوارش زنبور عسل (باکتری‌های اسید لاکتیک)، در اثر آنتی بیوتیک‌ها از بین می‌روند. باکتری‌های اسید لاکتیک خود مانع رشد عوامل بیماری‌زا زنبور عسل از جمله پنی باسیلوس لاروه عامل بیماری لوک آمریکایی می‌شود[۱۷]. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که در جمعیت حشرات بین باکتری‌های همزیست و مقاومت در برابر بیماری‌هایی که آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد، یک تعادل برقرار است. باکتری‌های همزیست عامل مقاومت حشرات در برابر بیماری‌ها محسوب می‌شوند[۱۸] که با توجه به آنها می‌توان استراتژی‌های جدید مبارزه، پیشگیری، کنترل و درمان بیماری‌های مهم زنبور عسل را طراحی کرد.

ضد عفونی کندو و استفاده از تابش پرتو گاما برای از بین بردن فرم اسپور و رویشی پنی باسیلوس لاروه، قابل توجه هستند. تاثیر درمان شیمیایی با آنتی بیوتیک‌ها موقتی است و تنها فرم رویشی باکتری را از بین می‌برد. علاوه بر این، استفاده گسترده از آنتی بیوتیک‌ها سبب تجمع باقی مانده دارویی در محصولات کندو شده و این امر سبب کاهش کیفیت و بروز مشکلاتی در بازاریابی آنها می‌شود. آزمایشات تعیین مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک‌ها در اواخر دهه ۱۹۴۰[۸] آغاز شد. مطالعات اولیه نشان داد که کلر تتراسیکلین علیه پنی باسیلوس لاروا موثر بوده، در حالی که پنی سیلین، کلرامفینیکل، استرپتومایسین، و سایر آنتی بیوتیک‌ها فعالیت ناچیزی علیه پنی باسیلوس لاروه داشتند. اکسی تتراسیکلین (OTC)، از اوایل دهه ۱۹۵۰ برای پیشگیری و کنترل بیماری لوک آمریکایی و لوک اروپایی استفاده شده است[۹]. اخیراً در مورد مقاومت گسترده به اکسی تتراسیکلین در آرژانتین[۱۰] و همچنین در مناطق مختلف در ایالات متحده[۴] نگرانی‌هایی به وجود آمده است، به همین دلیل آنتی بیوتیک‌های دیگری مثل تایلوزین و اریترومایسین از گروه ماکرولید به عنوان کنترل و پیشگیری لوک آمریکایی بررسی شده است[۱۱، ۱۲]. ماقچوآ[۱۳] در چکسلواکی سایر آنتی بیوتیک‌ها را در یک مطالعه سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی بر روی ده سویه از پنی باسیلوس لاروه جدا شده از مناطق مختلف مورد آزمایش قرار داد. همچنین در ژاپن تعداد زیادی از سویه‌های پنی باسیلوس لاروه برای سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی مورد آزمایش قرار گرفتند[۱۴]. مطالعه ال- آو و همکاران[۱۵] نشان داد که ۴ ایزوله پنی باسیلوس لاروه در برابر آنتی بیوتیک‌های پنی سیلین، دوکسی سیلین، انروفلوكسازین، ریفارمپیسین و تایلوزین نسبت به اکسی تتراسیکلین حساس‌تر بودند. در مطالعه حاضر منطبق با دستورالعمل استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی[۱۶] برای سنجش حساسیت آنتی





یافته ترویجی

- (2000) Antibacterial activity of plant extracts and phytochemicals on antibiotic resistant bacteria.- Brazilian Journal of Microbiology, 31: 247-256.
- 7- Dirk C de Graaf et al. (2013) Standard methods for American foulbrood. Journal of Apicultural Research 52(1): (2013).
- 8- Katzenelson H., Arnott J., Bland S.E. (1952) Preliminary report on the treatment of European foulbrood of honey bees with antibiotics, Scince Agriculture. 32, 180–184.
- 9- Gochnauer T.A. (1951) Drugs fight foulbrood diseases in bees, Minn. Home Fm. Sci. 9, 15.
- 10- Alippi A.M. (2000) Is Terramycin losing its effectiveness against AFB? Bee Biz 27–29.
- 11- Hitchcock J.D., Moffett J.O., Lackett J.J., Elliott J.R. (1970) Tylosin for control of American foulbrood disease in honey bees, Journal of Economic Entomology. 63, 204–207.
- 12- Moffett J.O., Hitchcock J.D., Lackett J.J., Elliott J.R. (1970) Evaluation of some new compounds in controlling American foulbrood, Journal of Apicultural Research. 9, 39–44.
- 13- Machova M. (1970) Variations de la sensibilité aux antibiotiques souches de Bacillus larvae, Bull. Apic. 13, 5–11.
- 14- Okayama A., Sakogawa T., Nakajima C., Hayama T. (1996) Biological properties and antibiotic susceptibility of Bacillus larvae originated from American foulbrood of honeybee in Japan, Journal of Veterinary Medical Scince.58, 439–441.
- 15- El-AW et al (2013) An evaluation of the efficiency of different antibiotics for control of the American foulbrood disease of honey bees. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, February, 27 (27): 493-502.
- 16- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS) (2012) Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty-Second informational supplement – January 2012.
- ۱۷- محرومی، مجتبی (۱۳۹۲). مقاومت ضد میکروبی و اهمیت آن در بهداشت عمومی. فصل ۱۳، صفحه ۲۱۵-۲۲۱.
- 18- Kenneth Todar (2012). Todars Online Text book of bacteriology, Bacterial Resistance to antibiotics, university of Wisconsin, Department of bacteriology.

نتایج مطالعه انجام شده به ما کمک می کند که زنبورداران را از وضعیت موجود آگاه نموده و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و داروهای شیمیایی را در سطح زنبورستانها تحت نظارت و کنترل سازمانهای اجرایی درآوریم. آگاهی زنبور داران نقش بسزایی در جلوگیری از مصرف نابجای آنتی بیوتیک ها و مواد شیمیایی داشته و تاثیرات همه جانبیهای در سلامت تغذیه ای جامعه مصرف کنندگان، ارتقاء اقتصادی زنبور داران و افزایش صادرات عسل بر جای خواهد گذاشت. از نظر مصرف کننده، فرآورده های زنبور عسل به عنوان یک فرآورده طبیعی با ارزش باید عاری از هر نوع عوامل غیر طبیعی و مصنوعی باشد، بنابراین مصرف اصولی دارو در کنдо باید به عنوان یک اصل اساسی و مهم همیشه مورد نظر باشد. در عین حال موضوع انتخاب دارو نیز از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در صلاحیت دائم پزشکان است که راهنمایی های لازم را در این خصوص بنمایند.

منابع

- 1- Genersch E., Forsgren E., Pentikainen J., Ashiralieva A., Rauch S., Kilwinski J., Fries I., (2006) Reclassification of Paenibacillus larvae subsp. pulvifaciens and Paenibacillus larvae subsp. larvae as Paenibacillus larvae without subspecies differentiation.- International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 56: 501-511.
- 2- Shimanuki H., Knox D.A. (1994) Susceptibility of Bacillus larvae to Terramycin, American Bee Journal. 134,125–126.
- 3- Bogdanov S., (2006) Contaminants of bee products - Apidologie, 37: 1-18.
- 4- Miyagi T., Peng C.Y.S., Chuang R.Y., Mussen E.C., Spivak M.S., Doi R.H. (2000) Verification of oxytetracycline-resistant American foulbrood pathogen Paenibacillus larvae in the United States, Journal of Invertebrate Pathology. 75, 95–96.
- 5- Evans E., (2003) Diverse origins of tetracycline resistance in the honey bee bacterial pathogen Paenibacillus larvae.- Journal of Invertebrate Pathology, 83: 56-50.
- 6- Nascimento G.G.F., Locatelli J., Freitas P.C., Silva G.L.,





Sensitivity of *Paenibacillus larvae* isolates against Oxytetracycline by the disc diffusion method

Moharrami M.*, Modirrousta H., Torkaman M.

Department of Honey Bee, Silk Worm & Wildlife, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran

Paenibacillus larvae, a Gram-positive and spore-forming bacterium is responsible for American foulbrood (AFB) disease in bees. AFB is a serious economic problem for beekeepers. The extensive use of antibiotics such as Oxytetracycline (OTC) against AFB have led to the accumulation of residues in honey and other beehive products, decreasing their quality and making their marketing more difficult. Besides residue accumulation, antibiotic resistant isolates of *P. larvae* have been detected in many countries. In this study, in view of the increasing incidence of Antibiotic-resistant bacteria in the world, we tested OTC against 22 isolated of *P. l.* larvae strains from different areas for Antibiotic Susceptibility by the disk diffusion method. Our results introduce evidence that 7 strains was very sensitive, 14 strains intermediate and 1 strain was resistant to OTC.

Key words: *Paenibacillus larvae*, American foulbrood disease, Disk diffusion method, Oxytetracycline

